

## INDICADOR DE MORTALITAT

El full de registre individual de mort per reacció aguda a substàncies psicoactives arplega en els criteris d'inclusió:

1. Antecedents de consum recent de substàncies psicoactives.
2. Anàlisis toxicològiques positives per a alguna substància enregistrable.
3. Signes d'autòpsia compatibles amb mort per reacció aguda després del consum de substàncies psicoactives.
4. Diagnòstic forense per reacció aguda a substàncies psicoactives.

Només s'arpleguen els casos que complisquen almenys un d'estos criteris. Ateses les característiques dels casos arplegats, basem este informe en les freqüències absolutes arplegades per a la capital o municipi de València.

*Taula núm. 1*

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
19	23	26	23	11	38	15

En els anys finals de la dècada els casos arplegats per reacció aguda a substàncies psicoactives estaven molt relacionats amb el consum d'heroïna en les distintes vies d'administració i amb signes clars o evidència del consum d'esta droga acompanyada de cocaïna, benzodiazepines i alcohol. La majoria n'eren hòmens, una cinquena part, dones, i l'edat mitjana era de 30 anys.

Però és a partir de l'any 2004, que el comodí de les substàncies detectades en la mort per reacció aguda és la cocaïna, fins a l'actualitat. Amb l'anàlisi toxicològica, apareix el metabòlit corresponent a la cocaïna en el 80% dels casos enregistrats, amb una edat mitjana de 37 anys i amb un terç de dones. Dels casos notificats, només en un de 2004 apareix la cocaïna sola com a causa de mort per substància psicoactiva. En els anys següents es van multiplicant els casos de mort només amb cocaïna. En la resta, la causa de la mortalitat la determina el consum de diverses substàncies. Cal destacar que en el 66% d'estos casos la cocaïna s'acompanya de l'ús diari de la metadona. I, en el 33%, es troben fins a quatre substàncies psicoactives, que són: cocaïna, metadona, benzodiazepines, cànnabis i, en una, l'alcohol. De la resta de notificacions en què no apareix la cocaïna, la substància psicoactiva consumida immediatament abans de la mort és la metadona.

En conclusió, podem destacar, que, igual com a finals del segle la substància que apareixia en les notificacions era l'heroïna, ara és substituïda per la metadona com a principi actiu en la lluita per la reducció de riscos. També hem de destacar el canvi significatiu del consum d'heroïna pel de cocaïna. Respecte al nombre de morts l'any 2005, probablement la causa

d'este pic són circumstàncies aleatòries d'eixe any, perquè en el següent les notificacions següen les tòniques anteriors.

Per a concloure, apuntarem, des del seguiment dels anys, que el criteri de notificació o registre individual de mort per reacció aguda a substàncies psicoactives és igual des de 1999. Sens dubte l'aproximació als registres epidemiològics elaborats des de la Conselleria de Sanitat ens podrà desvelar dades d'altres municipis o del conjunt de la comunitat autònoma en un futur pròxim.